

دانوں سے بھری ہربالی شاندار پیداوار، لائے خوشحالی

گندم کا کراپ پروگرام

2022



Toll Free:
080023567

نیا سویرا

پریمی دستیاب ہیں

[Syngenta.Pakistan](https://www.syngenta.com/pakistan)

[SyngentaPakistan](https://www.syngenta.com/pakistan)

pk.info@syngenta.com



زمین کی تیاری

انرج

مقدار 8 کلوگرام فی ایکڑ
وجہ استعمال ضروری غذائی اجزاء کی فراہمی
وقت استعمال بجائی سے قبل، زمین کی تیاری کے وقت زمین میں ملا دیں

سیڈ ٹریٹمنٹ

وائبرینس ڈیو

مقدار 2 لیٹر 1 کلو گندم بیج کے لیے
بیماری لوز سٹ اور ہنٹ
وقت استعمال کاشت سے پہلے بیج کو لگائیں

بجائی اور آکاؤ کا مرحلہ

لوگران ۵ ڈی بی جی

مقدار 16 گرام فی ایکڑ
جزی بوٹیاں چوڑے پتوں والی
وقت استعمال بجائی کے فوراً بعد

پہلے بانس کا مرحلہ

نیا نیک پلس

مقدار 7.5 کلوگرام فی ایکڑ
وقت استعمال آکاؤ مکمل ہونے پر پہلی پوریا کھاد کے ساتھ ملا کر
نوٹ: نیا نیک دیگر کھادوں (ماسائے فاسفیٹ) کے ساتھ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

جھاڑ بننے کا عمل

ایکسیئل

مقدار 330 لیٹر فی ایکڑ
جزی بوٹیاں دہی سٹی اور جنگلی جوی
وقت استعمال نوکیلے پتے والی جزی بوٹیاں جب 2 سے 3 پتوں کی حالت میں ہوں تب اسپرے کریں

جھاڑ بننے کا عمل

الائی میٹس

مقدار 14 گرام فی ایکڑ
جزی بوٹیاں تمام چوڑے پتوں والی
وقت استعمال وترکی حالت میں جب جزی بوٹیاں 3 سے 4 پتوں کی حالت میں ہوں تو الائی میٹس کا اسپرے کریں

جھاڑ بننے کا عمل

والٹرسوپر

مقدار 350 لیٹر فی ایکڑ
جزی بوٹیاں چوڑے پتوں والی
وقت استعمال جب جزی بوٹی 4-2 سے متعلقہ مرحلے میں ہو اور تیزی سے بڑھ رہی ہو تو استعمال کریں۔ ایک سیزن میں صرف ایک اسپرے کریں۔

جھاڑ بننے کا عمل

بروموگزینیل + ایم۔ سکی۔ پی۔ ایے
140% ای سی

مقدار 500 لیٹر فی ایکڑ
جزی بوٹیاں باتھو، شاہترہ، پیلازی، دھدک، مینا، جنگلی ہاؤ، رولازی، لیسلی اور جنگلی پالک وغیرہ
وقت استعمال بہترین نتائج کے لیے بوٹی کے 30 سے 35 دن کے بعد استعمال کریں

جھاڑ بننے کا عمل

میٹرک بوزین
70% ڈیلٹامیٹھ

مقدار 80 گرام فی ایکڑ
جزی بوٹیاں دہی سٹی، باتھو، سمیتھی
وقت استعمال جب 2 سے 3 پتوں کی حالت میں ہوں تب اسپرے کریں
نوٹ: میٹرک بوزین بوزین پھینک سس صرف مزاحمت والے ایریا میں کریں۔

سٹہ بننے کا عمل

طلٹ

مقدار 200 لیٹر فی ایکڑ 100 لیٹر پانی میں
بیماری سنگی، رسب
وقت استعمال پہلا اسپرے جھاڑ بننے کے فوراً بعد دوسرا اسپرے 15 دن بعد
نوٹ: زہر پاشی کے بعد کم از کم ایک دن یا فصل کے خشک ہونے تک داخل نہ ہوں

سٹہ بننے کا عمل

ایزابیات

مقدار 400 لیٹر فی ایکڑ
مسئلہ غذائی اجزاء کی کمی
وقت استعمال پہلا اسپرے جھاڑ مکمل ہونے پر دوسرا اسپرے دانے کی بھرائی پر
نوٹ: تمام کڑے اور پھپھوہ کش زہر (ماسائے فاسفیٹ) کے ساتھ نیک کس کر کے استعمال کیا جاسکتا ہے

گوہو کے پانی کے ساتھ

نیا پوناش
30% ڈیلٹامیٹھ

مقدار 3 لیٹر فی ایکڑ بذریعہ آبپاشی
مسئلہ پوناش کی کمی
وقت استعمال گوہ کی حالت میں پانی کے ساتھ
اسپرے 1000 لیٹر فی ایکڑ 75 سے 80 دن پر

