


# دھان کی مرحلہ وار دیکھ بھال

کٹائی کا مرحلہ			گوبھ کا مرحلہ				جھاڑ کا مرحلہ			منتقلی کا مرحلہ		فصل کی حالت
کٹائی	فصل کے پکنے کا عمل	سٹہ کی دودھیاں حالت	سٹے کا باہر نکلنا 10% - 5%	گوبھ کی حالت	گوبھ کا ابتدائی مرحلہ	سٹہ بننے کے عمل کا آغاز	مکمل جھاڑ	درمیانہ جھاڑ	ابتدائی جھاڑ	لاپ کی منتقلی	پنیری کی کاشت	
کٹائی سے 30 دن پہلے کوئی اسپرے نہ کریں۔			امیستار ٹاپ	کراٹے	استور	منتقلی کے 40 دن بعد ورٹاکو	نیا گوتاش	منتقلی کے 20 دن بعد ورٹاکو	اپائیرو فورٹ	انرج	اپرون میکس	
			اور ایزابیاک	یا پلینم	+ ایزابیاک	یا ورٹاکو	تھائیووٹ جیٹ	اور نیا نیکا پلس	لیفیٹ	رائیسر		
			پلینم									



گوبھ کی حالت کے بعد کراٹے کا استعمال نہ کیا جائے۔

